

Posiadacz zezwolenia:

CBC (Europe) S.r.l., via E. Majorana 2, 20834 Nova Milanese (MB), Włochy, tel. +39 - 0362-365079, fax: +39 - 0362-41273, e-mail: sfranceschini@cbceurope.it

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:

CBC (Europe) S.r.l., via E. Majorana 2, 20834 Nova Milanese (MB), Włochy, tel. +39 - 0362-365079, fax: +39 - 0362-41273, e-mail: sfranceschini@cbceurope.it

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Biocont Polska Sp.z o.o., ul. Stefana Jaracza 24/38, 31-215 Kraków, e-mail: biocont@biocont.pl, tel.: +12 416 25 81

## Lepinox Plus

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej: *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki*, szczep EG 2348 (związek mikrobiologiczny) - 150 g/kg (15%)

**Zezwolenie MRiRW nr R - 48/2017 wu z dnia 19.12.2017 r.**

EUH 208	Zawiera bakterię <i>Bacillus thuringiensis</i> . Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH401	W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P261	Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P280	Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
P302+P352	W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P333+P313	W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391	Zebrać rozsypany produkt.

### OPIS DZIAŁANIA

Insektycyd o działaniu selektywnym, w postaci proszku do sporządzania zawiesiny wodnej (WP), stosowanym nalistnie do biologicznego zwalczania gąsienic motyli.

Środek ma działanie żołądkowe. Po spożyciu śmiertelnej dawki środka, gąsienice przestają żerować, mogą pozostawać żywe jeszcze przez kilka dni. Na roślinie działają powierzchniowo.

Zgodnie z klasyfikacją IRAC substancja czynna *Bacillus thuringiensis* zaliczana jest do grupy 11.

### STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego lub sadowniczego lub opryskiwacza ręcznego (w tym plecakowego).

Zaleca się wykonanie pierwszego zabiegu w trakcie lub bezpośrednio po wylęgu gąsienic. Zabieg zaleca się wykonać wieczorem.

### Jabłoń

*Zwójkówki liściowe*

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 kg/ha.

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana dawka wody: 250–500 l/ha  
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.  
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

#### **Pomidor pod osłonami**

*ślonecznica orężówka, gąsienice motyli sówkowatych, skośnik pomidorowy*  
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 kg/ha.  
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.  
Zalecana ilość wody: 400-600 l/ha.  
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.  
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

### **STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOBSZAROWYCH**

*Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność  
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych  
ponosi wyłącznie jego użytkownik*

#### **Papryka, sałata, ogórek (w gruncie i pod osłonami)**

*światłówka naziemnica, gąsienice motyli sówkowatych*  
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 kg/ha.  
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.  
Zalecana ilość wody: 300 – 800 l/ha.  
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.  
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 3.

#### **Kapusta głowiasta, kalafior, brokuł (w gruncie)**

*piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinek kapustnik*  
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 kg/ha.  
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.  
Zalecana ilość wody: 300 – 500 l/ha.  
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.  
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 3.

#### **Cukinia, fasola (w gruncie)**

*ślonecznica orężówka, gąsienice motyli sówkowatych*  
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 kg/ha.  
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.  
Zalecana ilość wody: 300 – 600 l/ha.  
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.  
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 3.

#### **Truskawka (w gruncie i pod osłonami)**

*gąsienice motyli sówkowatych*  
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 kg/ha.  
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 400 – 600 l/ha.  
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.  
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 3.

### **Grusza**

*zwójka rdzaweczka,, gąsienice zwójkówek liściowych*  
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 kg/ha.  
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.  
Zalecana ilość wody: 250 – 500 l/ha.  
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.  
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 3.

### **Brzoskwinia, nektaryna**

*owocówka południoweczka, skośnik brzoskwiniaczek*  
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 kg/ha  
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni  
Zalecana ilość wody: 250 – 500 l/ha.  
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.  
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 3

### **Winorośl**

*zwójka krzyżoweczka, zwójka kwasigroneczka*  
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 kg/ha.  
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.  
Zalecana ilość wody: 400 – 600 l/ha.  
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.  
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 3.

### **Chmiel**

*omacnica prosowianka*  
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 kg/ha.  
Zalecana ilość wody: 800 – 2000 l/ha.  
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.  
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 3.

### **Bukszpan**

*ćma bukszpanowa*  
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 kg/ha.  
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.  
Zalecana ilość wody: 400 – 600 l/ha.  
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.  
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 3.

## **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA**

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):  
środku nie stosować w dniu zbioru.

W przypadku wystąpienia opadów do 48 h po aplikacji, zabieg należy powtórzyć.

Nie mieszać środka z produktami o silnie alkalicznym pH. Mieszanina nie powinna przekroczyć pH 8,0.

### **SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ**

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).

Po wlewniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Roztwór do opryskiwania stosować bezpośrednio po jego przygotowaniu, mieszając. Nie pozostawiać roztworu do opryskiwania na więcej niż dwanaście godzin.

### **POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY**

Resztki cieczy użytkowej należy:

- jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub
- unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
- unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

### **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH**

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną oraz ochronę oczu i dróg oddechowych zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

### **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO**

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W przypadku, gdy zabieg wykonywany jest opryskiwaczem polowym:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku, gdy zabieg wykonywany jest opryskiwaczem sadowniczym:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

## **WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA**

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w oryginalnych opakowaniach,
- w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,
- w temperaturze 5 °C - 30 °C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

## **PIERWSZA POMOC**

Antidotum: brak.

Symptomy i oddziaływania: działanie drażniące, kaszel, duszność. U niektórych osób może mieć działanie uczulające.

W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Nie stosować jakiegokolwiek leku, bez konsultacji z lekarzem.

W przypadku połknięcia: wypłukać usta wodą, wypić do 2 szklanek wody. Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny nie dawać mu wody, nie powodować wymiotów. Natychmiast skontaktować się z lekarzem i pokazać mu opakowanie lub etykietę. Osobie nieprzytomnej nie należy podawać niczego do jedzenia.

W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. NIE wywoływać wymiotów jeśli nie jest to zalecane przez personel medyczny.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać etykietę środka.

Okres ważności - 3 lata

Data produkcji - .....

Zawartość netto - .....  
Nr partii - .....